





objet

Rechercher

les agents principaux des diarrhées néonatales des

cible

Elevage ayant enregistré deux veaux morts de diarrhée dans les deux mois précédents (veaux entre 1 jour et 1 mois d'âge)


protocole

Prélèvements de selles diarrhéiques, et de sang, sur trois veaux pris en début d'évolution de diarrhée (avant administration de tout traitement)

- bactériologie salmonelle sur selles
- coloration directe pour la mise en évidence de rotavirus, coronavirus, E. coli et **cryptosporidie** sur selles (recherche de type "tetrakit")
- virologie BVD par PCR sur sang

Dosage des anticorps colostraux (estimation à partir des protéïnes totales du sérum) sur le sang de 6 veaux à 8-10 jours après la naissance (pour lesquels la prise de colostrum s'est déroulée dans les conditions habituelles).

En testant si possible 3 veaux issus de génisses & 3 veaux issus de vaches au 2ème vêlage ou plus



Diarrhée néonatale des veaux



protocole remboursement

80 % des frais HT d'analyses de laboratoire

pièces justificatives

- Fiche de commémoratifs renseignée par le vétérinaire traitant
- Deux bons d'équarrissage témoignant de deux mortalités de veaux sur les deux mois précédents Factures du laboratoire

Toute demande d'aménagement de ce protocole doit faire l'objet d'un accord préalable de la part du GDS.

de au diagnostic